Impfplan Österreich 2017

Übersichtstabelle:
Impfkalender des kostenfreien Kinderimpfprogramms:

Säuglinge und Kleinkinder

Legende

	Empfohlene Impfung, kostenfrei		Empfohlene Impfung, kostenpflichtig
	Nachholimpfung, kostenfrei		Empfohlene Nachholimpfung, kostenpflichtig

Alter → / ↓Impfung	1. Lebensjahr							2. Lebensjahr		3.-5. Lebensjahr	6. Lebensjahr
	7. Woche	3. Monat	4./5. Monat	6. Monat	7.-9. Monat	10.-11. Monat	12.-13. Monat	14. Monat	15.-24. Monat		
Rotavirus	2-3 Impfungen (impfstoffabhängig), Abstand 4 Wochen										
Diphtherie Tetanus Pertussis Poliomyelitis		2 Impfungen, Abstand 2 Monate					Abstand 6 Monate zur 2. Impfung				
Haemophilus infl. B											
Hepatitis B											
Pneumokokken		2 Impfungen, Abstand 2 Monate					Abstand 6 Monate zur 2. Impfung			*	
Mumps Masern Röteln						2 Impfungen, Abstand 4 Wochen					

∗ Kostenfrei für Risikokinder

Schulkinder

Alter → / ↓Impfung	7. Lebensjahr	8.-9. Lebensjahr	10. Lebensjahr	11. Lebensjahr	12. Lebensjahr	13. Lebensjahr	14. Lebensjahr	15. Lebensjahr
Diphtherie Tetanus Pertussis Poliomyelitis			Auffrischung alle 10 Jahre			*		
Hepatitis B	Auffrischung oder Grundimmunisierung nachholen							
Mumps Masern Röteln	Nachholen							
Meningokokken ACWY								
Humane Papillomaviren			2 Impfungen, Abstand 6 Monate			2 Impfungen, Abstand 6 Monate, vergünstigter Selbstkostenpreis		

∗ Kostenlos nachholen bei Kindern, die im 7.-9. Lebensjahr nur eine Impfung gegen Diphtherie-Tetanus-Poliomyelitis erhalten haben

Detailinformationen siehe Impfplan Österreich 2017:
bmgf.gv.at/home/impfplan

Impfplan Österreich 2017

Legende

	Empfohlene Impfung, kostenpflichtig		Empfohlene Nachholimpfung, kostenpflichtig

Übersichtstabelle: Impfkalender weiterer empfohlener Impfungen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr, nicht kostenfrei

Säuglinge und Kleinkinder

Alter → / ↓Impfung	1. Lebensjahr			2. Lebensjahr				
	7. Woche	3.-6. Monat	7.-12. Monat	13.-14. Monat	15. Monat	16. Monat	17.-19. Monat	20.-24. Monat
Meningokokken B Impfschema altersabhängig		3 Impfungen, Abstand 1 Monat						
Meningokokken C Impfschema altersabhängig								
FSME Impfschema abhängig vom Impfstoff				2 Impfungen, Abstand 1-3 Monate				
Varizellen				2 Impfungen, Abstand 4 Wochen, vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen				
Hepatitis A				2 Impfungen, Abstand 6 Monate, vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen				
Influenza			Erstimpfung bis vollend. 8. Lebensjahr: 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen, danach jährliche Auffrischung					

Schulkinder

Alter → / ↓Impfung	3.-5. Lebensjahr	6. Lebensjahr	7. Lebensjahr	8.-9. Lebensjahr	10. Lebensjahr	11.-12. Lebensjahr	13. Lebensjahr	14.-15. Lebensjahr
Meningokokken B	Nachholen							
Meningokokken C	Nachholen					Siehe Meningokokken ACWY		
FSME		3 Jahre nach 3. Impfung	Auffrischung alle 5 Jahre					
Varizellen	Nachholen							
Hepatitis A	Nachholen							
Influenza	Auffrischung Jährlich							

Hinweis: Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfungen bei Versäumnis möglichst bald nachgeholt werden.

Detailinformationen siehe Impfplan Österreich 2017:
bmgf.gv.at/home/impfplan